

Příbalový leták pro pacienty

CERAMENT BONE VOID FILLER

Co je CERAMENT BONE VOID FILLER?

CERAMENT BONE VOID FILLER je syntetická náhrada kostního štěpu, která obsahuje síran vápenatý (60 %), hydroxyapatit (40 %) a C-TRU. C-TRU je kapalina obsahující iohexol, která zajišťuje lepší viditelnost na rentgenových snímcích a při fluroskopii. CERAMENT BONE VOID FILLER obsahuje iohexol (206 mg na mL pasty), trometamol (0,6 mg na mL pasty), edetan sodný (0,05 mg na mL pasty) a kyseliny chlorovodíkovou (méně než 1 mg na mL pasty).

K čemu se CERAMENT BONE VOID FILLER používá?

CERAMENT BONE VOID FILLER se používá u pacientů, kteří mají kostní defekt/ mezeru, k vyplnění kostního defektu/mezery na podporu hojení kosti.

Jak CERAMENT BONE VOID FILLER funguje?

V průběhu času dochází k resorpci a remodelaci prostředku CERAMENT BONE VOID FILLER do nové kosti, obvykle během 6–12 měsíců po implantaci.

Je nutné nějaké zvláštní sledování nebo monitorování, pokud máte implantovaný prostředek CERAMENT BONE VOID FILLER?

Není nutná žádná další chirurgická léčba ani monitorování. Po operaci budou následovat běžné kontroly.

Nežádoucí účinky

Implantace prostředku CERAMENT BONE VOID FILLER s sebou nese stejná rizika, jaká se vážou ke každému chirurgickému zákroku, konkrétně jde o infekci, bolest, modřiny, otok a krvácení v místě operace.

Pokud byl prostředek CERAMENT BONE VOID FILLER použit v blízkosti kloubu, může dojít k zánětu (zarudnutí, otoku, bolesti) kloubu.

V měkkých tkáních může prostředek CERAMENT BONE VOID FILLER způsobit zánětlivou reakci (zarudnutí, otok, bolest).

Ve vzácných případech může prostředek CERAMENT BONE VOID FILLER vést k nahromadění tekutiny nebo unikání tekutiny z rány, tato tekutina má bílou barvu. Taková „bílá drenáž z rány“ ve většině případů bez další léčby vymizí během dvou až tří týdnů.

Riziko závažné reakce na C-TRU nebo jeho pomocné látky (iohexol, trometamol, edetan sodný, kyselinu chlorovodíkovou) se považuje za nízké. Otok obličeje, jazyka, hrtanu, svědění nebo otok kůže, popřípadě vyrážka však mohou být příznaky anafylaktické reakce.

Pokud se u vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte lékařskou pomoc.

Užíváte i jiné léky?

Informujte svého chirurga o veškerých lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívali nebo které možná budete užívat.