

Letak za pacijenta

CERAMENT V

Što je CERAMENT V?

CERAMENT V je sintetički koštani nadomjestak koja se sastoji od kalcijevog sulfata (60 %), hidroksiapatita (40 %), vankomicin-klorida i tekućine C-TRU. C-TRU je tekućina koja sadrži joheksol, koja osigurava poboljšanu vidljivost na rendgenskim snimkama i fluoroskopiji. CERAMENT V sadrži i joheksol (pasta od 206 mg/mL), vankomicin (pasta od 66 mg/mL), trometamol (pasta od 0,6 mg/mL), natrijev kalcijev edetat (pasta od 0,05 mg/mL) i klorovodičnu kiselinu (pasta od manje od 1 mg/mL).

Za što se upotrebljava CERAMENT V?

CERAMENT V se upotrebljava za bolesnike koji imaju koštano šupljinu/oštećenje, kako bi se popunila koštana šupljina/oštećenje te kako bi se podržalo zacjeljivanje kostiju i spriječila infekcija.

Kako funkcioniра CERAMENT V?

Tijekom vremena CERAMENT V se resorbira i preuređuje u novu kost u roku od 6 - 12 mjeseci nakon implantacije. Vankomicin pomaže u sprječavanju kolonizacije.

Je li potrebno posebno nadziranje ili praćenje ako imate ugrađen CERAMENT V?

Nije potrebno daljnje kirurško liječenje ili praćenje, imat ćeće rutinske pregledne nakon operacije.

Znači li vankomicin u materijalu CERAMENT V da ne moram uzimati odvojeno antibiotike?

Ne. Ako su vam nakon operacije propisani antibiotici, morate ih uzimati jer vankomicin u materijalu CERAMENT V ne zamjenjuje potrebu za oralnim ili intravenskim antibioticima.

Štetni učinci

Implantacija materijala CERAMENT V nosi iste rizike povezane sa svakom operacijom kao što su infekcija, bol, modrice, oteklini i krvarenje na mjestu operacije.

Ako se CERAMENT V upotrebljava u blizini zgloba, to može uzrokovati upalu (crvenilo, oteklinu, bol) zgloba.

Unutar mekog tkiva, CERAMENT V može izazvati upalnu reakciju (crvenilo, oteklini, bol).

U rijetkim slučajevima CERAMENT V može dovesti do sakupljanja tekućine ili tekućine koja curi iz rane, koja je bijele boje. Ova "bijela drenaža rane" rješava se u većini slučajeva u roku od dva-tri tjedna bez daljnog liječenja.

Rizik od ozbiljne reakcije na C-TRU, vankomicin ili njihove pomoćne tvari (joheksol, trometamol, natrijev kalcijev edetat, klorovodična kiselina) smatra se neznatnim. Međutim, oticanje lica, jezika, grkljana, svrbež ili natečena koža ili osip mogu biti znakovi anafilaktičke reakcije.

Potražite savjet liječnika ako iskusite bilo koji od ovih simptoma.

Koristite li druge lijekove?

Obavijestite svog kirurga ako koristite, nedavno ste koristili ili biste mogli koristiti bilo koje druge lijekove.