

Patient Informatie Brochure

CERAMENT V

Wat is CERAMENT V?

CERAMENT V is een synthetisch botvervangend implantaat en bevat calciumsulfaat (60%), hydroxyapatiet (40%), vancomycine hydrochloride en C-TRU. C-TRU is een iohexolbevattende vloeistof, die zorgt voor een betere zichtbaarheid op röntgenstralen en onder fluoroscopie. CERAMENT V bevat iohexol (206 mg/mL pasta), vancomycine (66 mg/mL pasta), trometamol (0,6 mg/mL pasta), natriumcalciumedetaat (0,05 mg/mL pasta) en waterstofchloride (minder dan 1 mg/mL pasta).

Waarvoor wordt CERAMENT V gebruikt?

CERAMENT V wordt gebruikt voor patiënten met een botholte/defect, om de botholte/defect op te vullen teneinde de botgenezing te ondersteunen en infectie te voorkomen.

Hoe werkt CERAMENT V?

Na verloop van tijd, binnen 6-12 maanden na implantatie, wordt CERAMENT V tot nieuw bot geresorbeerd en gereïmmuniseerd. De vancomycine helpt vorming te voorkomen.

Is er een speciale vervolgactie of controle nodig als CERAMENT V is geïmplant?

Er is geen verdere chirurgische behandeling of controle nodig, u krijgt routinematige vervolgafspraken na uw operatie.

Betekent de vancomycine in CERAMENT V dat ik afzonderlijk geen antibiotica hoeft te nemen?

Nee. Als u na uw operatie antibiotica voorgeschreven heeft gekregen, moet u deze innemen, omdat vancomycine in CERAMENT V de noodzaak van orale of intraveneuze antibiotica niet vervangt.

Nadelige effecten

Implanteren van CERAMENT V brengt dezelfde risico's met zich mee als bij elke willekeurige operatie, zoals infectie, pijn, blauwe plekken, zwelling en bloedingen op de plaats van de operatie.

Als CERAMENT V in de buurt van een gewricht wordt gebruikt, kan dit een ontsteking (roodheid, zwelling, pijn) van het gewricht veroorzaken.

In zacht weefsel kan CERAMENT V een ontstekingsreactie veroorzaken (roodheid, zwelling, pijn).

In zeldzame gevallen kan CERAMENT V leiden tot een verzameling vloeistof of vocht die uit de wond lekt en die wit van kleur is. Deze 'witte wonddrainage' verdwijnt in de meeste gevallen binnen twee-drie weken zonder verdere behandeling.

Het risico op een ernstige reactie op C-TRU, vancomycine of hun hulpstoffen (iohexol, trometamol, natriumcalciumedetaat, waterstofchloride) wordt als gering beschouwd. Zwelling van het gezicht, tong, strottenhoofd, jeukende of gezwollen huid of uitslag kunnen echter allemaal tekenen zijn van een anafylactische reactie.

Zoek medisch advies als u een van deze symptomen ervaart.

Gebruikt u andere geneesmiddelen?

Vertel uw chirurg als u andere geneesmiddelen gebruikt, onlangs hebt gebruikt of zou kunnen gebruiken.