

Bipacksedel

CERAMENT V

Vad är CERAMENT V?

CERAMENT V är ett syntetiskt bengrafts substitut, innehållande kalciumsulfat (60 %), hydroxidapatit (40 %), vankomycinhydroklorid och C-TRU. C-TRU är en vätska som innehåller iohexol, vilket ger förbättrad synlighet vid röntgen och fluoroskopi. CERAMENT V innehåller iohexol (206 mg/mL pasta), vankomycin (66 mg/mL pasta), trometamol (0,6 mg/mL pasta), natriumkalciumedetat (0,05 mg/mL pasta) och saltsyra (mindre än 1 mg/mL pasta).

Vad används CERAMENT V till?

CERAMENT V används för patienter som har ett benhålrum/-defekt, för att fylla benhålrummet/-defekten och därmed stödja benläkning och förhindra infektion.

Hur verkar CERAMENT V?

CERAMENT V resorberas över tid och omformas till nytt ben inom 6–12 månader efter implantation. Vankomycin hjälper till att förhindra kolonisering.

Krävs någon särskild uppföljning eller övervakning om du har CERAMENT V implanterat?

Ingen ytterligare kirurgisk behandling eller övervakning krävs, men du kommer att ha de rutinmässiga uppföljningsmötena efter din operation.

Betyder vankomycinet i CERAMENT V att jag inte behöver ta antibiotika separat?

Nej. Om du har ordinerats antibiotika efter din operation måste du ta det, eftersom vankomycinet i CERAMENT V inte ersätter behovet av oral eller intravenös antibiotika.

Biverkningar

Implantering av CERAMENT V medför samma risker som förknippas med varje operation, såsom infektion, smärta, blåmärken, svullnad och blödning vid operationsplatsen.

Om CERAMENT V användes i närheten av en led, kan det leda till inflammation (rodnad, svullnad, smärta) i leden.

I mjukvävnad kan CERAMENT V orsaka en inflammatorisk reaktion (rodnad, svullnad, smärta).

I sällsynta fall kan CERAMENT V leda till en ansamling av vätska eller vitfärgad vätska som läcker från såret. Detta "vitsårsläckage" försvinner i de flesta fall inom två-tre veckor utan ytterligare behandling.

Risken för en allvarlig reaktion på C-TRU, vankomycin eller deras hjälpämnen (iohexol, trometamol, natriumkalciumedetat, saltsyra) betraktas som liten. Men svullnad i ansikte, tunga, struphuvud, kliande eller svullen hud eller utslag kan alla vara tecken på en anafylaktisk reaktion.

Kontakta läkare om du upplever något av dessa symtom.

Använder du andra läkemedel?

Tala om för din kirurg om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.